

レジメン名 ロンサーフ+ベバシズマブ

1 コースの日数 28日

	薬剤	投与量	投与方法	投与時間	Day				
					1	～	15	～	28
1	パロノセトロン デキサメタゾン ポララミン	0.75mg/50mL 6.6mg 5mg	点滴静注	30分	○		○		
2	プロイメンド 生理食塩液	150mg 100mL	点滴静注	30分	○		○		
3	ベバシズマブ 生理食塩液	5 mg/kg Total 100mL	点滴静注	90分 (2回目以降短縮可能)	○		○		

備考；

上記と合わせてロンサーフを下記の用法・用量にて4週間ごと服薬。

day1の夕食後から開始し、Day6の朝食後まで内服、2日休薬。

Day8の夕食後から開始し、Day13の朝食後まで内服、16日休薬。

体表面積	初回基準量 (70mg/ m ² /日) (トリフルリジン相当量)
<1.07m ²	70mg (T15 2錠+T20 2錠)
1.07m ² ～ 1.23m ² 未満	80mg (T20 4錠)
1.23m ² ～ 1.38m ² 未満	90mg (T15 6錠)
1.38m ² ～ 1.53m ² 未満	100mg (T15 4錠+T20 2錠)
1.53m ² ～ 1.69m ² 未満	110mg (T15 2錠+T20 4錠)
1.69m ² ～ 1.84m ² 未満	120mg (T20 6錠)
1.84m ² ～ 1.99m ² 未満	130mg (T15 6錠+T20 2錠)
1.99m ² ～ 2.15m ² 未満	140mg (T15 4錠+T20 4錠)
2.15m ² <	150mg (T15 10錠)

<減量基準>

前コース(休薬期間を含む)中に、減量基準に該当する有害事象が発現した場合には、本剤の投与再開時において、コース単位で1日単位量として10mg/日単位で減量する。ただし、最低投与量は30mg/日までとする。

	減量基準
好中球数	500/mm ³ 未満
血小板数	50,000/mm ³ 未満