

レジメン名 CAPOX

1 コースの日数 21日

	薬剤	投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	～	21
1	パロノセトロン デキサメタゾン ポララミン	0.75mg/50mL 6.6mg 5mg	点滴静注	30分	○		
2	プロイメンド 生理食塩液	150mg 100mL	点滴静注	30分	○		
3	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	100mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	2時間	○		

備考；

上記と合わせてカペシタビンを下記の用法・用量にて day1 の夕食後から開始し、day15 の朝食後まで内服。

体表面積	初回投与量 (2,000mg/m <sup>2</sup> /day)	減量段階 1	減量段階 2
< 1.36m <sup>2</sup>	2,400mg (8錠)	1,800mg (6錠)	1,200mg (4錠)
1.36m <sup>2</sup> ~ 1.41m <sup>2</sup>	3,000mg (10錠)		
1.41m <sup>2</sup> ~ 1.51m <sup>2</sup>		2,400mg (8錠)	
1.51m <sup>2</sup> ~ 1.66m <sup>2</sup>			1,800mg (6錠)
1.66m <sup>2</sup> ~ 1.81m <sup>2</sup>	3,600mg (12錠)		
1.81m <sup>2</sup> ~ 1.96m <sup>2</sup>		3,000mg (10錠)	
1.96m <sup>2</sup> ~ 2.11m <sup>2</sup>	4,200mg (14錠)		2,400mg (8錠)
2.11m <sup>2</sup> <			