

レジメン名 CAPOX+ベバシズマブ

1コースの日数 21日

	薬剤	投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	～	21
1	パロノセトロン デキサメタゾン ポララミン	0.75mg/50mL 6.6mg 5mg	点滴静注	30分	○		
2	プロイメンド 生理食塩液	150mg 100mL	点滴静注	30分	○		
3	ベバシズマブ 生理食塩液	7.5 mg/kg Total 100mL	点滴静注	90分 (2回目以降短縮可能)	○		
4	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	130mg/m ² 250mL		2時間	○		

備考；

上記と合わせてカペシタピンを下記の用法・用量にて day1 の夕食後から開始し、day15 の朝食後まで内服。

体表面積	初回投与量 (2,000mg/m ² /day)	減量段階 1	減量段階 2
<1.36m ²	2,400mg (8錠)	1,800mg (6錠)	1,200mg (4錠)
1.36m ² ～ 1.41m ²	3,000mg (10錠)		
1.41m ² ～ 1.51m ²		2,400mg (8錠)	
1.51m ² ～ 1.66m ²			1,800mg (6錠)
1.66m ² ～ 1.81m ²	3,600mg (12錠)		
1.81m ² ～ 1.96m ²		3,000mg (10錠)	
1.96m ² ～ 2.11m ²	4,200mg (14錠)		2,400mg (8錠)
2.11m ² <			