

レジメン名 SOX+ベバシズマブ

1コースの日数 21日

	薬剤	投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	～	21
1	パロノセトロン デキサメタゾン ポララミン	0.75mg/50mL 6.6mg 5mg	点滴静注	30分	○		
2	プロイメンド 生理食塩液	150mg 100mL	点滴静注	30分	○		
3	ベバシズマブ 生理食塩液	7.5 mg/kg Total 100mL	点滴静注	90分 (2回目以降短縮可能)	○		
4	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	100mg/m ² 250mL	点滴静注	2時間	○		

備考；

上記と合わせて S-1 を下記の用法・用量にて day1 の夕食後から開始し、day15 の朝食後まで内服。

	S-1		
	体表面積		
	<1.25m ²	1.25～1.5m ²	≥1.5m ²
通常投与量	80mg/day	100mg/day	120mg/day
1段階減量	50mg/day	80mg/day	100mg/day
2段階減量	40mg/day	50mg/day	80mg/day

項目		S-1
好中球数	<500/mm ³	1段階減量
発熱性好中球減少症	好中球<1,000/mm ³ かつ腋窩音≥38℃	
血小板数	<25,000/mm ³	1段階減量 (L-OHP 50mg/m ² の場合)
	Day29で <75,000/mm ³	
下痢、口内炎、 手足症候群	≥Grade 3	1段階減量
アレルギー/過敏症	≥Grade 3	同量継続
末梢神経症状	Grade 2	同量継続
	Grade 3	
	Grade 4	